



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

موضوع

بررسی عوارض بالینی جراحی های دندان عقل نهفته در بیماران
مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی
قزوین در سال ۱۳۸۳

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام بهلولی زنجانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محسن جباری

نگارش

امیر محمدی

حکیره:

به دنبال جراحی دندان، خواه نا خواه عوارضی بروز می کند، بنابراین باید تمام سعی و کوشش بکار رود تا این عوارض به حداقل برسد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته می باشد. نوع مطالعه، توصیفی - تحلیلی می باشد.

در کل ۱۱۴ مورد جراحی دندان عقل نهفته، بر روی ۵۳ بیمار انجام شده است. که از بین آنها ۲۰ نفر مرد و ۳۳ نفر زن بودند. سن افراد شرکت کننده، ۵۸-۱۷ سال با میانگین سنی ۲۷/۹ سال بود. در این تحقیق فرم رضایت نامه، توسط بیمار تکمیل شده و بعد بیمار با هماهنگی استاد بخش و توسط دانشجو جهت جراحی آماده می شد. افراد مبتلا به بیماری سیستمیک و افرادی که به هر دلیلی دارو مصرف می کردند از این تحقیق حذف شدند. در این تحقیق از دو نوع فلپ جراحی، ۱۰۱ مورد (۸۸/۶ درصد) فلپ پاکتی و ۱۳ مورد (۱۱/۴ درصد) فلپ مثلثی استفاده شد. بعد از جراحی، زخم ۱۰۵ مورد (۹۲/۱ درصد) با نخ بخیه سلیک و زخم ۹ مورد (۷/۹ درصد) با نخ بخیه کرومیک، بسته شد. به کلیه بیماران دستورات بعد از عمل و رعایت بهداشت، آموزش داده شد. سپس کلیه بیماران بعد از یک هفته جهت معاینه و پیگیری عوارض به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی قزوین مراجعه کردند و عوارض بوجود آمده در طول یک هفته یادداشت شد. از کل جراحی های انجام شده، ۱۰۱ مورد جراحی (۸۸/۶ درصد) دچار عارضه درد و تورم شدند که بیشترین میزان عارضه بود و پس از آن ۲۲ مورد (۱۹/۳ درصد) دچار خونریزی، ۹ مورد (۷/۹ درصد) دچار آسیب به عصب حسی و ۴ مورد (۳/۵ درصد) دچار عفونت پس از جراحی دندان عقل نهفته شدند. کلیه عوارض بعد از یکماه بهبود یافته بودند، تنها در یک مرد ۵۸ ساله عارضه بهبود نیافته بود که مشکل، آسیب به عصب حسی در فک پائین بود. جراحی دندان عقل نهفته آن فرد، جهت آماده سازی فک برای استفاده از پروتز کامل متحرک انجام شده بود.